

## Recueil d'urines chez le bébé

1

Faire une toilette génitale avec de l'antiseptique et de l'eau  
Bien sécher la peau

اغسل الجهاز التناسلي جيدا باستخدام المطهر و الماء  
جفف الجلد جيدا



2

Retirer le film protecteur recouvrant la zone adhésive

قم بإزالة الطبقة الواقية التي تغطي المنطقة اللاصقة



3



♂  
Pour les garçons : Le pénis doit être  
inséré dans l'ouverture  
للأولاد: يجب ادخال القضيب كله في الفتحة



♀  
Pour les filles: l'ouverture doit exposer la partie  
supérieure de la zone génitale  
بالنسبة للفتيات: يجب أن توضع الفتحة على المخرج العلوي من  
المنطقة التناسلية

4

Faire boire le bébé et attendre l'écoulement d'urine.  
Le collecteur ne doit pas rester en place plus de **2 heures**.  
Ce délai passé, ou s'il a été souillé par des selles,  
le collecteur doit être remplacé


أشرب الطفل وانتظر تدفق البول. يجب ألا يظل المجمع في مكانه لأكثر من ساعتين  
إذا تعدت هذه المدة، أو تلوث بالغانط، يجب استبدال المجمع



5

Retirer et fermer soigneusement le collecteur.  
Mettre le collecteur tout entier dans le pot.

ازل المجمع و اغلقه بعناية  
ضع المجمع بأكمله في الوعاء



6

Refermer soigneusement le pot et coller le code à barre fourni  
par le laboratoire sur le flacon  
اغلق الوعاء بعناية و ألصق الملصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



7

Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire ( maximum 30 minutes)

اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن (30 دقيقة كحد أقصى)



LABO  
مختبر